Rapport d'analyse micro-IDent®
réalisée par Hain Lifescience
Test ADN d'identification de 5 bactéries parodontopathogènes

heico Dent
Schitterstrasse 11
CH-9413 Oberegg

Nom du patient	**Exemple micro-IDent**
Date de naissance	Non spécifié
Echantillon	Echantillon multi-sites / Feuille 1 de 1
Analyse	Analyse Initiale
Nombre d'analyses	ANA123333/999
Date de l'analyse	18.06.2007
Dent / Dents	Non spécifié
Profondeur de poche maximale	Non spécifié

Résultat

Analyse microbiologique: Les concentrations bactériennes trouvées nécessitent un traitement dû à la présence des complexes suivants:Complexe rouge (Pg,Tf,Td), Complexe orange (Pi). En fonction des signes cliniques il est nécessaire, en plus d'un traitement mécanique (SRP), d'administrer des antibiotiques additionnels (**Métronidazole: 3 x 400 mg/jour, 7 jours. p. ex. Flagyl (Aventis). Scénario 2**). Pour une évaluation du succès thérapeutique une analyse de contrôle est recommandée 8 semaines après l'arrêt de la prise d'antibiotique. Prière de noter que la présence potentielle d'autres espèces bactériennes peut influencer l'antibiothérapie. Une analyse complémentaire avec le test micro-IDent plus, c'est à dire l'analyse de 6 espèces supplémentaires, est recommandée.



Explication sur les concentrations des pathogènes

- = <10^4 (Exception Aa: <10^3)
(+) = 10^4 (Exception Aa: 10^3)
+ = <10^5 (Exception Aa: <10^4)
++ = <10^6 (Exception Aa: <10^5)
+++ = >10^7 (Exception Aa: >10^6)

Abréviation dénomination des bactéries

Aa = *Actinobacillus actinomycetemcomitans*
Pg = *Porphyromonas gingivalis*
Tf = *Tannerella forsythia*
Td = *Treponema denticola*
Pi = *Prevotella intermedia*
Pm = *Peptostreptococcus micros*
Fn = *Fusobacterium nucleatum/periodonticum*
Cr = *Campylobacter rectus*
En = *Eubacterium nodatum*
Ec = *Eikenella corrodens*
Cs = *Capnocytophaga spec. (gingivalis, ochracea, sputigena)*

Fumeur	Non spécifié. Si le patient est fumeur, ce facteur de risque doit être considéré lors de l'élaboration du plan de traitement. Dans ce cas, la détermination du risque génétique avec GenoType PST est recommandée.
Allergies aux antibiotiques	Aucune information relative à une hypersensibilité potentielle aux antibiotiques pour le patient inscrite sur l'ordonnance. Vérifier obligatoirement l'absence d'hypersensibilité avant de prescrire un antibiotique!
Commentaires additionnels	Non spécifié